

## Zásady poskytovania prvej pomoci

*Je prirodzenou povinnosťou každého občana, aby podľa svojich možností poskytol prvú pomoc bez rozdielu každému, koho postihol úraz alebo náhle ochorenie. Poskytnutie prvej pomoci je nielen prirodzenou (morálou) povinnosťou každého občana, ale aj povinnosťou, ktorá vyplýva zo zákona o starostlivosti o zdravie ľudu. Prvá pomoc sa musí poskytovať pri všetkých úrazoch, otravách a náhlych ochoreniach. Neodborné poskytnutie laickej prvej pomoci nie je zákonom postihnuteľné.*

### 1. Názvy a definície

**Prvá pomoc** je súbor jednoduchých a účelných opatrení, ktorými sa má pri náhlom ohrození alebo narušení hodnôt zabrániť rozvoju ďalšieho poškodenia a zmierniť následky poškodenia na najmenšiu mieru. Prvú pomoc možno rozdeliť na technickú a zdravotnícku.

**Technická prvá pomoc** je odstránenie vonkajších fyzikálnych a chemických príčin, ktoré spôsobili úraz, otravu alebo náhle ochorenie a ktoré neustále zhoršujú stav postihnutého, kým ich vplyv trvá. Často je predpokladom pre poskytnutie zdravotníckej prvej pomoci.

**Zdravotnícka prvá pomoc** je súbor opatrení, ktoré pri náhlom ohrození alebo postihnutí zdravia cieľavedome a účinne obmedzujú rozsah a dôsledky ohrozenia alebo postihnutia. Zdravotnícku prvú pomoc možno rozdeliť na zdravotnícku laickú prvú pomoc a zdravotnícku odbornú prvú pomoc.

**Zdravotnícka laická prvá pomoc** je súbor základných odborných a technických zdravotníckych opatrení poskytovaných spravidla bez špecializovaných prostriedkov. Súčasťou laickej prvej pomoci je privolenie odbornej pomoci a starostlivosť o postihnutého do jeho odovzdania do zdravotníckeho ošetrenia.

**Úraz** je každé násilné poškodenie tela, ktoré zanecháva následky vo forme otvorených rán, vnútorných zmien, pomliaždenín, vykľbenín, zlomenín, popálenín, poleptania a pod.

**Otrava** je každé poškodenie zdravia alebo spôsobenie smrti účinkom chemickej látky (jedu).

**Náhla príhoda** je náhle vzniknuté ochorenie alebo vzplanutie skrytej či chronickej choroby. Môže vzniknúť aj u zdanivo zdravého. Začína väčšinou prudko, vyvíja sa často až dramaticky a neraz ohrozí postihnutého aj na zdraví.

### 2. Zásady poskytovania prvej pomoci pri náhlom postihnutí zdravia

Základným pravidlom pri poskytovaní prvej pomoci je robiť všetko, čo stav postihnutého vyžaduje a čoho je záchranca schopný, ale len v rozsahu, ktorý bezpečne ovláda.

**Pri poskytovaní prvej pomoci treba zachovať nasledovný postup:**

- špecifikovať rozsah postihnutia (odstrániť lebo prerušiť pôsobenie vyvolávajúce príčiny a umožniť poskytnutie prvej pomoci)
- orientovať sa o zdravotnom stave a rozsahu poškodenia (posúdenie stavu bezprostredného ohrozenia života s nebezpečenstvom z omeškania a postihnutia bez bezprostredného ohrozenia života – stav vedomia, dýchania a krvného obehu)

- vykonať opatrenia zachraňujúce život, poskytnúť ďalšiu prvú pomoc podľa stavu postihnutého a účinnými opatreniami zabrániť vzniku alebo rozvoju komplikácií
- orientovať ďalšiu pomoc (zabezpečiť šetrný a rýchly odvoz postihnutého do zdravotníckeho zariadenia, zabezpečiť sprevádzanie postihnutého) odovzdať postihnutého do sústavy rýchlej zdravotníckej pomoci.

### **3. Prvá pomoc pri náhlom zastavení krvného obehu**

---

#### **Ako resuscitovať**

**Náhle zastavenie krvného obehu znemožňuje prísun kyslíka a živín do tkanív a buniek, a súčasne zabraňuje odsunu toxických látok z buniek smerom von z tela. Tento proces v konečnom dôsledku viedie k smrti.**


Najcitlivejšími na nedostatok kyslíka a živín sú mozgové bunky. Tolerancia je v tomto prípade štyri, maximálne päť minút kým nastane nezvratný proces ich poškodzovania.


**Z uvedených dôvodov je nesmierne dôležité do príchodu odbornej pomoci nahradit srdce ako pumpu a prostredníctvom kardiopulmonálnej resuscitácie sa pokúsiť spomalíť vyššie popísaný proces.**

- **Najdôležitejšie je v takýchto situáciách samotné rozpoznanie náhlej zástavy krvného obehu.** To je vždy spojené s poruchou vedomia, resp. s bezvedomím. Postihnutý padá na zem často krát bez akýchkoľvek varovných príznakov.
- **Pri náhlej zástave obehu sa riadime predovšetkým dýchaním.** Postihnutého opatrne uložíme do vodorovnej polohy na chrbát, najlepšie hned' na tvrdú podložku. Popri tom pátrame najmä po masívnom krvácaní, ktoré mohlo nastať úrazom. Je vhodné ak ihned' od začiatku kľačíme z boku vedľa postihnutého približne na rozhraní hlavy a hrudníka.
- Nenásilným zatrasením za rameno a hlasným zvolaním postihnutého a teda či reaguje, alebo nereaguje na oslovenie.
- V prípade, že nereaguje nazrieme do ústnej dutiny či sa v nej nenachádzajú cudzie predmety, napr. potrava, alebo umelá zubná náhrada. Ak áno, čistou tkaninou napr. vreckovkou ich odstránime.
- Čahom za bradu a miernym tlakom na čelo postihnutého podvihneme sánku smerom dohora a **priložíme svoje ucho k ústam postihnutého tak, že sa súčasne dívame na jeho hrudník.** Počúvame či z úst vychádza vzduch, či cítime jeho prúdenie na našej ušnici a súčasne sledujeme či sa dvíha hrudník. V prípade, že sa nič z uvedeného nedeje, d'alej nepátrame po iných príznakoch, ale ihned' predpokladáme náhlu zástavu krvného obehu. Nenechajme sa zvestiť nepravidelným, občasným, chrčivým dýchaním, ktoré často sprevádza tieto stavy. Nejedná sa o dostatočné a účinné dýchanie.
- **Privoláme odbornú pomoc najlepšie prostredníctvom tretej osoby a okamžite zahajujeme kardiopulmonálnu resuscitáciu.** Začíname stláčaním hrudníka v jeho strede do hĺbky aspoň päť centimetrov, alebo do výšky jednej treťiny hrudníka frekvenciou viac ako sto krát za minútu. Naše dlane zopneme prekrížením prstov do tzv. zámku, hranu dlane položíme na stred hrudníka, vystrieme ruky v lakočoch a plynulými pohybmi stláčame hrudník. Po stlačení vždy hrudník uvoľníme, ale iba do tej miery, aby sme nestratili kontakt s povrchom tela postihnutého. **Počet stlačení u dospelej osoby je vždy tridsať v pomere k dvom dychom. Pokial' však nie sme ochotní do**

**postihnutého dýchať, stláčame aspoň hrudník a to nepretržite pričom každé dve minúty na krátko prestaneme a podvihnutím sánky ľahom za bradu uvoľníme tlak nahromadeného vzduchu v dýchacích cestách, ktorý sa tam stláčaním hrudníka prirodzene dostáva.**

- V prípade, že sme sa rozhodli aj pre umelé dýchanie z plúc do plúc je potrebné podvihnuť sánku rovnakým ľahom za bradu smerom dohora ako pri vyšetrovaní postihnutého, dvomi prstami zapchať nos zatlačením mäkkých častí k sebe, perami obopnúť pery postihnutého a **dvakrát po sebe plynule do postihnutého vdýchnuť** neveľké množstvo vzduchu tak, aby sa mu nadvihol hrudník. Bez meškania sa opäť presúvame k hrudníku a pokračujeme v jeho stláčaní.
- **Tento postup opakujeme až do príchodu odbornej pomoci, alebo do obnovenia spontálnej srdcovej aktivity** pričom približne každé dve minúty kontrolujeme stav dýchania postihnutého rovnako ako pri prvotnom vyšetrení, najmä či sa dýchanie neobnovilo.
- Kardiopulmonálna resuscitácia je náročná. **Vzhľadom na duševné i fyzické vypätie je vhodné ak sa aspoň dvaja záchrancovia v úkonoch striedajú** a to v rôznych intervaloch, v závislosti od ich kondície. Je možné povedať, že kardiopulmonálna resuscitácia prebieha v zásade rovnako bez ohľadu na vek postihnutého.
- **Iba u novorodencov platí, že ju zahajujeme piatimi úvodnými vdychmi a pomer stláčania hrudníka a záchranných vdychov je tri ku jednej. Tri stlačenia, po ktorých nasleduje jeden záchranný vdych.**






*Postavenie zápästia obidvoch rúk pri nepriamej masáži*

#### **4. Prvá pomoc pri náhlych poruchách a zastavení dýchania**

Poruchou dýchacej činnosti sa rozumie dusenie z nedostatku vzduchu alebo úplné zastavenie dychu. K najčastejším príčinám porúch dýchacej činnosti patria :

- prekážky v dýchacích cestách (cudzie telesá, blokáda dýchacích ciest krvou a zvratkami, kŕč hlasiviek, zapadnutý koreň jazyka, prerušenie dýchacích ciest, popletenie pl'úcneho tkaniva a pod.).



##### *Kontrola obsahu ústnej dutiny*

- poranenie alebo ochorenia ústrednej nervovej sústavy,
- náhle zastavenie obehu,
- nervosvalové poruchy (tetanus, obrna),
- poruchy zloženia vdychovaného vzduchu (nedostatok kyslíka, prítomnosť jedovatých plynov a pod.).

##### **Vonkajšie príznaky náhlych príhod až zastavenie dýchania sú rôzne a závisia od príčiny a rýchlosťi priebehu poruchy:**

- dýchacie pohyby hrudníka sú postrehnutelné, ale nad ústami a nosom nie je počuť ani cítiť dychová prúd,
- dýchacie pohyby hrudníka sú veľmi riedke (menej než 10/min.),
- dýchacie pohyby hrudníka a nadbruška úplne vymizli,
- počas niekoľko desiatok sekúnd sa objaví namodralé zafarbenie (cyanóza) najprv slizníc a nechťového lôžka, potom okrajových častí tela.

##### **Ak je v dýchacích cestách cudzí predmet, pristupujú k týmto príznakom ešte ďalšie príznaky :**

- pri kompletnej prekážke dochádza k výrazným dýchacím pohybom (vonkajšie paradoxné dýchanie), ale nepočuť nijaké dýchacie šelesty,
- pri čiastočnej prekážke sa objaví úzkostlivý výraz tváre, nepokoj, vystúpnuté krčné žily, paradoxné pohyby hrudníka a brušnej steny.

Ak sa postihnutý dusí a reaguje na naše pokyny, požiadajte ho, aby sa posadil na stoličku, ruky oprel o kolena a sklonil hlavu. Udríte ho medzi lopatky a vyvolajte kašeľ.

Ak sa postihnutý dusí a nereaguje, postavte sa za jeho chrbát, chyťte ho zozadu a zopnite ruky pod jeho hrudníkom. Prudkým rýchlym pohybom hore a dovnútra ho pritiahnite k sebe (Heimlichov manéver).

Ak je postihnutý v bezvedomí, obkročmo si naňho kľaknite, bruško dlane jednej ruky položte tesne pod rebrá, druhú ruku položte na pravú a zatlačte smerom dopredu a dolu. Dusenie a zastavenie dychu sú tak závažné príhody, že vyžadujú okamžité poskytnutie prvej pomoci - resustitáciu.

### Technický postup resustitácie

Poskytnutie prvej pomoci pri náhlych poruchách dýchania a zastavení dýchania spočíva:

- v kontrole a vyčistení ústnej dutiny a hltana tak, že záchranca položí postihnutého do vodorovnej polohy naznak, obráti mu hlavu na jednu stranu a dvoma prstami ovinutými vreckovkou vytrrie ústnu dutinu,
- v zabezpečení priechodnosti horných dýchacích ciest čo najväčším záklonom hlavy, príp. s predsunutím spodnej čeľuste pred hornú.



Základný postup pri zabezpečení záklonu hlavy

Záklon hlavy sa dosiahne tým, že záchranca položí postihnutému jednu ruku na šiju a druhou pritlačí na čelo tak, aby sa hlava čo najviac zaklonila a krk prehol. Tým sa jazyk, opierajúci o zadnú stenu hltana, oddiali a uvoľní dýchacie cesty.

Ak sa neobjaví dýchanie treba postihnutému vysunúť dolnú čeľust tak, že záchranca uchopí uhol dolnej čeľuste prstami oboch rúk a posunie ju smerom dopredu tak, aby dolné zuby boli pred hornými (predhryznutie)


- v umelom dýchaní, ktoré sa musí začať ihneď po uvoľnená priechodnosti dýchacích ciest. Nesmie sa prerušíť ani počas prapravy postihnutého. Umelé dýchanie možno robiť z plúc do plúc a núdzovo ručnými metódami.

### Dýchanie z plúc do plúc sa robí:

- z úst do úst (len vtedy ak postihnutý nejaví známky dýchania),
- z úst do nosa (vhodné pri zranení pier, pri kŕčovom zavretí úst, pri obave z vydávania žalúdočného obsahu, alebo ak má záchranca malé ústa),
- z úst do úst a nosa zároveň (vhodné u malých detí),
- pomocou T-tubusu.

Pri dýchaní z úst do úst udržuje záchranca jednou rukou záklon hlavy tlakom dlane na čelo postihnutého a súčasne stláča palcom a ukazovákom tejto ruky obe nosné dierky. Druhou rukou (je pod bradou) pomáha udržať predsunutú dolnú čeľust. Palcom tejto ruky odtiahne dolnú peru tak, aby vznikla štrbina medzi perami asi jeden prst široká. Záchranca sa nadýchnie

široko otvorenými ústami, priloží ústa pevne okolo úst postihnutého a pozvoľna vydýchne do jeho dýchacích ciest. Súčasne pozoruje či sa pritom zdvíha hrudník postihnutého. Po vydýchnutí záchrancu rýchlo oddiali ústa (postihnutý pasívne vydýchne) a kontroluje či z úst postihnutého prúdi vzduch. Čas na výdych má byť asi dvojnásobkom času umelého vdychu. Najvhodnejšia frekvencia vdychov u dospelého je 12 - 16 vdychov za minútu, u starších detí 20 vdychov za minútu. Pri tomto spôsobe umelého dýchania možno použiť resuscitačné rúško.



#### *Dýchanie z pľúc do pľúc spôsobom z úst do úst*

Dýchanie u úst do nosa je podobné, ale s tým rozdielom, že ruka stláčajúca hlavu do záklonu ponechá nos voľný a palec druhej ruky (ktorá predsunuje dolnú čeľust' pred hornú) pritlačí pevne dolnú peru na hornú. Kontrola účinnosti umelého dýchania počas vdychu aj výdychu, počet umelých vdychov za minútu i celý ďalší postup je ten istý ako pri predošlom spôsobe. Pri tomto spôsobe sa nepoužíva resuscitačné rúško. Pri umelom dýchaní z úst do nosa a úst súčasne poloha tela postihnutého je rovnaká ako pri predošlých spôsoboch, len záklon hlavy je miernejší a nos a ústa zostávajú voľné. Záchranca otvorenými ústami obomkne nos od polovice jeho chrba cez nosné dierky a celé ústa. Tento spôsob sa zásadne používa u detí do 10 rokov, pričom platí, že čím je dieťa menšie, tým je počet dychov rýchlejší (u kojencov až 40-50/min) a objem vdychovaného vzduchu menší (u kojencov stačí objem vzduchu z ústnej dutiny).

#### **Treba si uvedomiť:**

- ak sa zastaví krvný obeh, v krátkom čase na to nasleduje zastavenie dychu,
- ak sa zastaví dýchanie, krvný obeh sa zastaví za 2-4 minúty.

V oboch prípadoch treba začať umelé dýchanie a súčasne aj nepriamu srdcovú masáž.  
Spojenie týchto postupov sa nazýva neodkladná resusstitúcia.

#### **Neodkladná resusstitúcia vyžaduje:**

- Položiť postihnutého do vodorovnej polohy naznak.
- Skontrolovať a vyčistiť ústnu dutinu a hltan.

- Uvoľniť priechodnosť dýchacích ciest (záklonom hlavy, predsunutím spodnej čeľuste).
- Začať umelé dýchanie troma za sebou idúcimi umelými vdychmi.
- Potom pokračovať v spojení nepriamej srdcovej masáže s umelým dýchaním, a to :
  - ak je len jeden záchranca, strieda 15 stlačení hrudnej kosti a dva hlboké umelé vdychy,
  - ak sú dvaja záchrancovia, striedajú 5 stlačení hrudníka a po nich po uvoľnení tlaku na hrudník 1 umelý vdych.
- Po 4 - 5 minútach u dospelých (u detí častejšie) treba vytlačiť vzduch zo žalúdka, a to ľahkým tlakom plochou dlaňou na brušnú stenu pod hrudnou košou. Pritom treba zdvihnuť trup postihnutého a predklonit mu hlavu. Umelé dýchanie sa ale nesmie prerušíť dlhšie než 15 sekúnd.

## 5. Prvá pomoc pri bezvedomí


Bezvedomie je stav, ak postihnutý neprijíma podnety z vonkajšieho prostredia, nespracúva ich a účelne na ne nereaguje.

K bezvedomiu dochádza pri nedostatočnom prekrvení mozgu, pri jeho nedostatočnom zásobení kyslíkom alebo pri anatomickej alebo funkčnej poruche mozgu.

Pričiny, ktoré vedú k vzniku bezvedomia, sú rôzne. K najčastejším patria: náhle zastavenie srdca, extrémne zrýchlená činnosť srdca, náhle rozšírenie ciev z horúčavy, ďalej je to dusenie, poranenie mozgu, otravy, veľká strata krvi a pod.

### Technický postup prvej pomoci

1. Postihnutého uložiť do vodorovnej polohy alebo ho šetrne odsunúť z nebezpečného miesta.
2. Zabezpečiť priechodnosť dýchacích ciest (zaklonením hlavy, predsunutím dolnej čeľuste; pri krvácaní do oblasti ústnej dutiny uložením v polohe na bricho).
3. Ak sa zastaví dýchanie, zastaví krvný obeh, alebo zastaví dýchanie aj krvný obeh súčasne, začať neodkladnú resusstitáciu.
4. Ak sa obnoví dostatočné dýchanie a krvný obeh treba postihnutého uložiť do stabilizovanej polohy na bok.
5. Po návrate vedomia kontrolovať dýchanie, priložiť studený obklad na hlavu, uložiť v tieni.
6. Ak je postihnutý v bezvedomí, nesmie sa mu podávať nijaký nápoj ani jedlo.



*Stabilizovaná poloha*

### Technika stabilizovanej polohy na boku

Stabilizovaná poloha je vhodná pre postihnutého v bezvedomí, ak nehrozí riziko poranenia krku alebo chrabtice.

Záchranca položí postihnutého na chrbát s rukami hore, akoby sa vzdával. Pokrčí mu pravé koleno. Pravou rukou pridrží pravú ruku postihnutého. Chytí pravé koleno postihnutého.

Potiahne postihnutého za rameno a koleno a prevráti ho na ľavý bok. Pravé rameno a pravú nohu mu pokrčí, aby sa nemohol prevrátiť na bricho. Zakloní mu hlavu, aby zvratky prípadne iné tekutiny mohli voľne vytiekať a aby nedošlo k zaduseniu. Záchranca sa postará, aby postihnutý bol v teple a v bezpečí, pravidelne sleduje jeho stav a čaká na odbornú pomoc.

## 6. Prvá pomoc pri poranení

Rana je porušenie kože, sliznice alebo vnútorných orgánov. Charakteristickým znakom je krvácanie, bolest strata alebo poškodenie tkaniva. Podľa rozsahu poškodenia možno rany rozdeliť na :

- povrchové - je poranená len koža,
- hlboké - poškodenie postihuje aj podkožie, svaly a kosti,
- prenikajúce - poškodené sú aj vnútorné dutiny.

## 7. Úraz elektrickým prúdom a elektrickým výbojom

- Vypnutie prívodu a šetrné vyslobodenie postihnutého, ak to nie je možné, neodkladné zabezpečenie technickej prvej pomoci,
- Zabezpečenie základných životných funkcií, umelé dýchanie, pri zastavení obehu nepriama masáž srdca a umelé dýchanie,
- Čo najmenšie krytie popálenín,
- Znehybnenie zlomenín,
- Neodkladné zabezpečenie rýchlej zdravotníckej pomoci.

## 8. PRVÁ POMOC PRI ĎALŠÍCH UDALOSTIACH

### Popáleniny

- Vynesenie z priestoru pôsobenia vysokej teploty a dymu,
- Zahasenie horiaceho odevu,
- Pri vzplanutí benzínu, po poliatí a zasiahnutí napalmom ponorenie do vody alebo pritlačenie viacerých vrstiev textilu,
- Pri hlbokých popáleninách s vyvinutými a rozsiahlymi pluzgiermi až do odumretia tkaniva osušenie suchým aseptickým obväzom s hrubšou odsávacou vrstvou s priložením ľahkej krycej vrstvy k tvári,
- Zvýšená poloha, prípadne znehybnenie ošetrených postihnutých miest bez prikrytie prikrývkou,
- Ošetrenie otvorených poranení,
- Pohodlná poloha poležiačky a šetrné prenášanie,
- Ochrana pred nepriaznivými poveternostnými vplyvmi, stratou tepla, pred vznikom triašky a prehriatím,
- Psychická podpora, upokojenie, zabezpečenie pokojného prostredia,
- Neodkladné zabezpečenie rýchlej zdravotníckej pomoci pri príznakoch šoku, hlbokých popáleninách, prípadne povrchových, ale rozsiahlych popáleninách, pri popáleninách novorodencov, dojčiat a malých detí a pri krutej bolesti.

### Nadýchanie sa horúcich párov a dymu

- Pri vedomí poloha posediačky s pohodlným opretím chrbta a hlavy,
- Pri bezvedomí stabilizovaná poloha so zvýšením hornej polovice tela,
- Dostatočný prívod chladného čerstvého vzduchu,
- Úplný telesný pokoj,
- Psychické uspokojenie,

- Nepretržitá kontrola dostatočnosti voľného dýchania,
- Včasné umelé dýchanie pri zhoršení priechodnosti dýchacích ciest a pri poruchách dýchania,
- Neodkladné zabezpečenie rýchlej zdravotníckej pomoci.

### **Nadýchanie sa dráždivých a dusivých párov**

- Vynesenie postihnutého zo zamoreného priestoru,
- Zabezpečenie úplného telesného pokoja,
- Psychické upokojenie,
- Uloženie do pohodnej polohy posediačky alebo v polosedu s opretím chrbta a hlavy,
- Pri dýchavičnosti a poruchách dýchania umelé dýchanie z plúc do plúc,
- Neodkladné zabezpečenie rýchlej zdravotníckej pomoci.

### **Podchladenie**

- Vynesenie postihnutého do závetria a sucha, do chráneného vlažného priestoru so zamedzením ďalšej straty telesného tepla,
- Pri bezvedomí zabezpečenie priechodnosti dýchacích ciest a teply obklad na prednú polovicu krku a hrudníka bez ohrevania končatín,
- Pri zastavení dýchania a nematnom pulze na krčnici umelé dýchanie a nepriama masáž srdca,
- Pôvodná poloha veľmi podchlodeného postihnutého v bezvedomí bez zbytočných zmien,
- Ošetrenie omrzlín a ľahký aseptický obváz na rany,
- Pri menej kritickom podchladení so zachovaným vedomím a základnými životnými funkciemi aktívne a pasívne pohyby postihnutými končatinami, ich zohrievanie najvhodnejšie v teplej vode 45° C
- Ak nie sú zásadné dôvody proti (vnútorné poranenie, bolesti brucha, zvracanie), podanie teplého čaju,
- Neodkladné zabezpečenie rýchlej zdravotníckej pomoci, najmä pri kritickom podchladení sprevádzanom bezvedomím.

### **Omrzliny**

- Prerušenie účinku chladu a vlhkosti,
- Zabezpečenie vlažného prostredia,
- Aktívne a pasívne pohyby postihnutými končatinami, ak nejde súčasne o celkové kritické podchladenie,
- Vlažný obklad na omrzeliny,
- Ľahký aseptický obváz na rany,
- Ak nie sú dôvody proti, podanie teplého čaju.

### **Poleptanie rohovky a dúhovky**

- Neodkladné oplachovanie a vyplachovanie dostatočným množstvom vody aspoň počas 15-20 minút,
- Priloženie aseptického obväzu na obidve oči,
- Neodkladné zabezpečenie rýchlej zdravotníckej pomoci.

### **Poleptanie kože a sliznice neznámym prostriedkom**

- Neodkladné oplachovanie dostatočným množstvom vody najmenej počas 15 - 20 minút,
- Priloženie aseptického obväzu na kožu,
- Neodkladné zabezpečenie rýchlej zdravotníckej pomoci pri poleptaní väčšej časti povrchu tela,

- Pri poskytovaní prvej pomoci pri poleptaní jedmi, najmä organofosfátmi, ochrana záchrancu okuliarmi, ochranným odevom, plášťom a rukavicami alebo igelitovými návlekmi.

### **Poleptanie kyselinami**

- Neodkladné oplachovanie dostatočným množstvom vody počas 15 - 20 minút,
- Ďalšie oplachovanie neutralizačnými roztokmi, napr. roztokom jedlej sódy, počas 10-30 minút,
- Priloženie aseptického obväzu navlhčeného neutralizačným roztokom,
- Neodkladné zabezpečenie rýchlej zdravotníckej pomoci.

### **Poleptanie zásaditymi látkami**

- - Postup podobný ako pri poleptaní kyselinami, neutralizačným roztokom je v tomto prípade veľmi zriedená kyselina citrónová alebo veľmi zriedený ocot.

### **Poleptanie sliznice ústnej dutiny**

- Neodkladný a opakovaný výplach studenou vodou, potom zriedeným neutralizačným roztokom ako v predchádzajúcich prípadoch,
- Zabezpečenie rýchlej zdravotníckej pomoci pri vzniku tăžkostí pri prehlávaní a voľnom dýchaní.

### **Poleptanie pažeráka a žalúdka**

- Neodkladné vyvolanie zvracania,
- Neodkladné zabezpečenie rýchlej zdravotníckej pomoci.

### **Otrava oxidom uholnatým**

- Pri otave svietiplynom, dymovými a výfukovými plynnimi, pri nedostatočnom spaľovaní zemného plynu okamžité vynesenie zo zamoreného priestoru,
- Pri zachovanom dostatočnom dýchaní iba zabezpečenie priechodnosti dýchacích ciest najvhodnejšie stabilizovanou polohou bez väčšieho záklonu hlavy,
- Pri nedostatočnom dýchaní umelé dýchanie z plúc do plúc,
- Pri zastavení krvného obehu umelé dýchanie s nepriamou masážou srdca,
- Neodkladné zabezpečenie rýchlej zdravotníckej pomoci, a to aj v prípadoch, keď sa postihnutý viditeľne preberá z bezvedomia.

## **VŠEOBECNÉ ZÁSADY POSKYTOVANIA PRVEJ POMOCI**

### **Ako postupovať?**

- Bez ohrozenia vlastného života zistite, čo sa stalo,
- Ako prvú vždy ošetrte najviac postihnutého,
- Zabezpečte privolenie sanitky, lekára, alebo dopravu zraneného do zdravotníckeho zariadenia.

### **Ako poskytnúť prvú pomoc?**

- Zastavte život ohrozujúce krvácanie,
- Pri bezvedomí – zaistite voľnosť dýchacích ciest,
- Pri zástave dýchania – poskytnite umelé dýchanie,
- Pri zástave srdca – poskytnite nepriamu masáž srdca,
- Venujte pozornosť protišokovým opatreniam.